

# 乙酰半胱氨酸片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

## 【药品名称】

通用名称：乙酰半胱氨酸片

英文名称：Acetylcysteine Tablets

汉语拼音：Yixian Banguang' ansuan Pian

【成份】本品每片含乙酰半胱氨酸 0.2 克。辅料为：聚维酮 K30、微晶纤维素、交联聚维酮、二氧化硅、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素、蔗糖、二氧化钛、聚乙二醇 4000。

【性状】本品为白色薄膜衣片，除去包衣后显白色。

【作用类别】本品为祛痰药类非处方药药品。

【适应症】适用于慢性支气管炎等咳嗽有粘痰而不易咳出的患者。

【规格】0.2 克

【用法用量】口服。成人常用量：每次 0.2 克（1 片），每日 3 次。一般疗程为 5~10 天。

【不良反应】本品口服偶尔发生恶心、呕吐、上腹部不适、腹泻、咳嗽等不良反应，一般减量或停药即缓解。罕见皮疹和支气管痉挛等过敏反应。

## 【禁忌】

1. 哮喘患者禁用。
2. 对乙酰半胱氨酸过敏者禁用。

## 【注意事项】

1. 有消化道溃疡病史者慎用。
2. 老年患者伴有严重呼吸功能不全者慎用。
3. 孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用，尚缺乏孕妇及哺乳期妇女的用药资料，因此不主张孕妇使用，治疗期间不推荐哺乳。
4. 肝功能不全患者应在医师指导下使用。
5. 本品仅用于成人。
6. 本品与铁、铜等金属及橡胶、氧气、氧化物接触可发生不可逆性结合而失效，

应避免接触。

7. 服用 1 疗程症状无缓解应去医院就诊，遵医嘱可延长服用期。
8. 如症状加重，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

**【药物相互作用】**

1. 应避免与酸性较强药物合用，后者可使本品作用明显降低。
2. 不可与活性炭同服，同服时本品 54.6%~96.2%被活性炭吸附。
3. 本品能降低青霉素、头孢菌素、四环素等的药效，不宜混合或同服，必要时可间隔 4 小时交替使用。
4. 本品与碘化油、糜蛋白酶、胰蛋白酶配伍禁忌。
5. 本品能增加金制剂的排泄。
6. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

**【药理作用】**本品为粘痰溶解剂，具有较强的粘液溶解作用。其分子中所含的巯基（-SH）能使痰中糖蛋白多肽链的二硫键（-S-S-）断裂，从而降低痰的粘滞性，并使痰液化而易咳出。

**【贮藏】**遮光、密封，在干燥处保存。

**【包装】**铝-铝包装，（1）10 片/板×1 板/盒；（2）10 片/板×2 板/盒。

**【有效期】** 36 个月（三年）

**【执行标准】** YBH05492008

**【批准文号】** 国药准字 H20080325

**【说明书修订日期】** 2014 年 10 月 09 日

**【生产企业】**

企业名称：海南赞邦制药有限公司

生产地址：海南省海口国家高新技术产业开发区

邮政编码：570314

电话号码：0898-68631288

传真号码：0898-68636924

如有问题可与生产企业联系。



